

ADECUACIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE MONITORIZACIÓN DE TRANSAMINASAS AL INICIO DE ABIRATERONA EN LA PRÁCTICA HABITUAL

Blanco Sánchez G; Salguero Olid A; Domínguez López M; García Martín F; Santos Rodríguez C; Martínez Bautista MJ

UGC FARMACIA

H.U. PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)

OBJETIVOS

Objetivo principal

- Evaluar la adecuación a ficha técnica de la monitorización de transaminasas durante los tres primeros meses de tratamiento con Acetato de Abiraterona en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

Objetivo secundario

- Observar las posibles alteraciones de transaminasas.

MATERIAL Y MÉTODOS




RESULTADOS

21 pacientes
 72,28 ± 9,12 años

16 de urología
 5 de oncología médica

ADECUACIÓN A FICHA TÉCNICA



De los 18 pacientes que no se adecuaron a la ficha técnica:
 -9 realizaron la primera monitorización a los 15 días y posteriormente mensual
 -9 realizaron monitorización mensual desde el inicio

De los 3 pacientes que se adecuaron:
 -2 pertenecían al servicio de Urología
 -1 pertenecía al servicio de Oncología

2 pacientes presentaron elevación grado 1 de AST.
 2 pacientes presentaron elevación grado 1 de ALT.

Resolución espontánea

CONCLUSIONES

- Nuestra práctica clínica habitual confirma que no se cumplen los criterios definidos en ficha técnica para monitorización de transaminasas durante los tres primeros meses de tratamiento con Abiraterona.
- A pesar de ello, ninguno de nuestros pacientes ha presentado toxicidad hepática superior a grado 1, por lo que podríamos asumir la monitorización mensual haciéndola coincidir con las visitas de seguimiento, sin riesgo para el paciente.