

EXPERIENCIA A CORTO PLAZO DE LA UTILIZACIÓN DE RAMUCIRUMAB EN SEGUNDA LÍNEA EN EL ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

Lopez Doldan MC, Casado Vázquez L, Gómez Márquez A, Fernández González MP, Domínguez Guerra M, Padrón Rodríguez B.



SERVIZO GALEGO de SAÚDE

Complejo Hospitalario Universitario de Ourense

OBJETIVO

Evaluar la respuesta a corto plazo y seguridad de Ramucirumab en pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico en un hospital universitario de segundo nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo.
Tto con : **RAMUCIRUMAB + PACLITAXEL**
01/2015 → 09/2016

Variables:

Sexo, edad, histología, estadio, ECOG, histología, metastasis, dosis y nº de ciclos.

FUENTES:
• Oncofarm
• Ianus

• Respuesta a corto plazo evaluación → TAC.
• Registro de reacciones adversas

RESULTADOS

Se incluyeron dos pacientes (un hombre y una mujer) con adenocarcinoma gástrico localmente avanzado (n=1) y metastásico (n=1) y una mediana de edad de 70,5 años. 100% ECOG 0.
El 100% habían recibido quimioterapia previa con platino (n=1) o con fluoropirimidinas (n=1).

Ramucirumab 8 mg/Kg días 1 y 15, y Paclitaxel 80mg/m² 1,8 y 15 cada 28 días.

Ramucirumab → NO reducciones de dosis.
Paclitaxel → ajuste por neurotoxicidad mantenida.

Actualmente un paciente continua a tratamiento (7 ciclos); el otro recibió 8 ciclos, y se suspendió por progresión.

Efectos adversos:

n = 2

• Astenia G1
• Estomatitis G1
• Neurotoxicidad G2

n = 1

• Hipertensión G1
• Epistaxis G1
• Mialgias G1
• Diarrea G1
• Mareos G1-2

CONCLUSIONES

En base a nuestros resultados, Ramucirumab muestra una buena tasa de respuesta a corto plazo en pacientes con carcinoma gástrico avanzado.

Los efectos adversos mas frecuentes son los descritos en ficha tecnica, siendo estos controlables y no obligando a la suspensión definitiva del fármaco.

Seria necesario ampliar el estudio para confirmar los datos de efectividad y seguridad en su utilización