


ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE NIVOLUMAB EN CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO

Ruiz López M, Alañón Plaza E, Gallego Aranda T, Morell Baladrón A

OBJETIVO

OBJETIVO: Evaluar retrospectivamente la utilización de nivolumab en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) tras quimioterapia previa con doblete de platino en nuestro hospital, así como estudiar la evolución de los mismos.



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo en el que se revisaron las historias clínicas desde marzo hasta octubre de 2016.

Herramientas: Registro de dispensación de quimioterapia e historia clínica informatizada.


Variables

- ✓ Edad
- ✓ Sexo
- ✓ Hábito tabáquico
- ✓ Estadío
- ✓ Histología del tumor
- ✓ Líneas previas y posteriores recibidas
- ✓ Número de ciclos de Nivolumab
- ✓ Motivo de suspensión
- ✓ Reacciones adversas

RESULTADOS

Se incluyeron 16 pacientes (10 mujeres; 6 hombres).
 Media de edad de 67,5 años.
 Se detectó una reacción adversa grave: toxicidad digestiva.
 Número de pacientes sin historial de hábito tabáquico: 1
 NÚMERO MEDIO DE CICLOS DE NIVOLUMAB: 4,9


HISTOLOGÍA DEL TUMOR



MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DEL FÁRMACO



NUMERO DE LINEAS PREVIAS



CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio fueron distintos a los de los ensayos pivotaes en cuanto a duración del tratamiento, probablemente debido al peor estado basal de los pacientes al comenzar el tratamiento con Nivolumab, ya que en los estudios pivotaes fue utilizado en segunda línea y en nuestro estudio en líneas posteriores.

Debido a que es un fármaco de reciente introducción, es necesario continuar el estudio a más largo plazo para ver la evolución de los pacientes que están en tratamiento activo.