

CÁNCER DE MAMA EN VARONES



HERNÁNDEZ ROJAS S, RAMOS SANTANA E, VIÑA ROMERO MM, GUTIÉRREZ NICOLÁS F, FERRER MACHÍN A, GONZÁLEZ PERERA I, MERINO ALONSO J, NAZCO CASARIEGO, GJ



MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio multicéntrico, observacional, longitudinal y descriptivo de la serie de casos con cáncer de mama diagnosticados durante un periodo de siete años (Julio 2010 – Julio 2017). Los criterios de inclusión fueron el sexo masculino y la confirmación histológica de cáncer de mama.

Se analizaron datos epidemiológicos, terapéuticos, tumorales y de supervivencia.

OBJETIVO

Describir la prevalencia del cáncer de mama en varones diagnosticado en dos hospitales de tercer nivel con un área de influencia de 500.000 personas en cada uno de los hospitales.



5º CONGRESO
de **Oncología Médica**
y **Farmacia Oncológica**

23-25 noviembre 2017



RESULTADOS

La edad media para éstos fue de 61 ± 10 años. Histológicamente 78,9 % fue ductal infiltrante; un 41,2 % fue diagnosticado en estadios precoces. Todos los pacientes presentaron receptores estrogénicos positivos, el 89,5% HER2 negativo y ningún caso hubo con receptores triple negativo. En pacientes no metastásicos la mediana de la SLP fue de 36,43 [20-51] y en pacientes metastásicos fue de 22,4 [16-36] meses.



CONCLUSIONES

Con el presente trabajo hemos querido mostrar los datos de incidencia de un tumor con una baja incidencia en varones.

La recomendación actual en cuanto a la hormonoterapia adyuvante es el tamoxifeno en todos los pacientes con receptores hormonales positivos. Los beneficios de la quimioterapia en los hombres con cáncer de mama son más difíciles de demostrar debido a que la mayoría de los tumores son receptor hormonal positivos y se presentan en hombres mayores con múltiples comorbilidades.

