

RESULTADOS DE LA DESENSIBILIZACIÓN A CARBOPLATINO EN PACIENTES CON CARCINOMA DE OVARIO E HIPERSENSIBILIDAD PREVIA

Zhan Zhou E, Domínguez Bachiller M, Toro Chico P, Hernando Polo S, Moro Moro MM, Pérez Encinas M.



OBJETIVOS


Analizar el resultado de la administración de carboplatino mediante pauta de desensibilización en términos de efectividad y tolerancia en pacientes con carcinoma de ovario y reacción de hipersensibilidad previa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional y retrospectivo en un hospital terciario en el que se evaluaron todas las pacientes diagnosticadas de carcinoma de ovario sensible a platinos que requirieron una pauta de desensibilización para la administración de carboplatino desde Marzo 2009 a Agosto 2017.

VARIABLES RECOGIDAS

Sexo, edad, esquema, ciclo en el que se produjo la hipersensibilidad y síntomas asociados, número de ciclos administrados mediante desensibilización y los motivos de suspensión del tratamiento.



EFICACIA

- Supervivencia libre de progresión (SLP)
- Tasa de respuesta objetiva (TRO)

SEGURIDAD

- Reacciones adversas del procedimiento y su gravedad

RESULTADOS



N = 10
Edad media
62 años (43-76)

- Carboplatino+Paclitaxel (7)
- Carboplatino+Gemcitabina (2)
- Carboplatino monoterapia (1)

REACCIÓN HIPERSENSIBILIDAD

- Mediana de ciclos en la que se produjo: 3 (2-5)
- Síntomas: eritema, disnea, prurito y vómitos.

SERVICIO ALERGOLOGÍA

Pruebas cutáneas
⊕ en 5 casos

PAUTA DE DESENSIBILIZACIÓN

- Mediana de ciclos administrados: 3 (2-6)
- Reacciones adversas: eritema leve controlado con dexclorfeniramina y dexametasona
- En ningún caso se suspendió el tratamiento debido a la hipersensibilidad

Mediana SLP

7.2 meses
(IC 95% 2.5-11.9)

TRO

- ✓ Respuesta completa (20%)
- ✓ Respuesta parcial (20%)
- ✓ Enfermedad estable (30%)
- ✓ Progresión de la enfermedad (30%)

CONCLUSIONES

- La desensibilización con carboplatino es una alternativa útil y eficaz para permitir su administración en pacientes con reacción infusional previa que requiere la coordinación multidisciplinar de distintos servicios.
- La tolerancia al procedimiento fue buena, manifestándose solo reacciones adversas leves y controlables por lo que puede considerarse una opción segura.

