



P.113

INTERACCIONES CON ANTINEOPLÁSICOS ORALES. DETECCIONES ENCONTRADAS Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

Serrano Vicente, M.C. Escolano Pueyo, A. Allué Fantova, N. Viñuales Armengol, M.C. Amador Rodriguez, M.P.
Servicio de Farmacia. Hospital San Jorge, Huesca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:

- ✓ Cuando los pacientes con un diagnóstico de cáncer inicia un tratamiento con un antineoplásico oral suele llevar otros medicamentos prescritos previamente.
- ✓ Los objetivos del trabajo son:
 - ✓ EVALUAR la INCIDENCIA de las interacciones encontradas entre los antineoplásicos orales prescritos por los oncólogos de nuestro hospital y la medicación habitual de los pacientes, en el momento del inicio de la quimioterapia oral

- ✓ ANALIZAR
 - El grado de severidad
 - Recomendaciones efectuadas a los pacientes
 - Intervenciones realizadas y grado de aceptación



MATERIAL Y MÉTODOS:

✓ ESTUDIO PROSPECTIVO

✓ POBLACIÓN Y PERIODO DE ESTUDIO: se incluyeron todos los pacientes que iniciaron un nuevo tratamiento antineoplásico oral durante el período de noviembre de 2016 a mayo de 2017 (7 meses). Pacientes con cualquier tipo de cáncer sólido (no hematológico).

FUENTES DE DATOS:



ONCOFARM®
FARMIS
(entorno hospitalario)



HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA
(entorno de Atención Primaria)



ENTREVISTA
CON EL
PACIENTE



B: no se necesita acción
C: controlar el tratamiento
D: considerar modificación
X: evitar combinación



● Amplia evidencia / evitar
● Evidencia menor / precaución
● Casos aislados o teórica


RESULTADOS:

PERIODO DE ESTUDIO	7 meses
Nº DISPENSACIONES	648 dispensaciones (68 inicios; 10,6%)
EDAD PACIENTES	67 años
SEXO PACIENTES	50% mujeres ♂ 50% mujeres ♀

54 / 68 pacientes que iniciaron tratamiento tomaban medicación domiciliar (79,4%)
Media de 4 fármacos por paciente
En 27 inicios se detectó al menos una interacción (40%)

INTERACCIONES DETECTADAS Y GRADO DE SEVERIDAD

Se detectaron un total de 44 interacciones



RECOMENDACIONES EFECTUADAS A LOS PACIENTES

- ✓ A 12 pacientes : como tomar el IBP respecto al nuevo tratamiento
- ✓ A 3 pacientes se les recomendó no tomar metamizol

INTERVENCIONES Y GRADO DE ACEPTACIÓN

- ✓ En 2 pacientes : interacción con estatinas
- ✓ En 1 paciente : interacción con quetiapina
- ✓ En 1 paciente : interacción con sulpirida
- ✓ En 2 pacientes : interacción con ADOs

En todos los casos se contactó con el facultativo responsable para revisar el tratamiento: 100% aceptación

CONCLUSIONES:

- ✓ Se encuentran un número considerable de interacciones
- ✓ Revisar interacciones consume tiempo del farmacéutico dedicado a oncología, no solo es detectarlas, también valorar su importancia clínica.
- ✓ Al revisarlas al inicio del tratamiento se puede intervenir directamente o contactar con el facultativo indicado para que valore su revisión.

