

Carcelero San Martín E, Riu Viladoms G, Mullera Martí M, Soler Blanco N, Castells Lao G, Codina Jané C.
Servicio de Farmacia, Área del Medicament. Hospital Clínic de Barcelona

Introducción

- ✓ Pomalidomida es un fármaco indicado en Mieloma Múltiple (MM) en pacientes resistentes o recidivantes que han recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el último tratamiento.

Objetivo

- ✓ El objetivo de este estudio es evaluar la utilización, efectividad y seguridad de pomalidomida en el tratamiento de MM en un hospital universitario de tercer nivel.

Material y métodos

- Estudio observacional retrospectivo de pacientes diagnosticados de MM y tratados con pomalidomida fuera de ensayo clínico.
- Los datos se obtuvieron mediante revisión de la historia clínica informatizada (SAP®) y el registro de dispensaciones ambulatorias en farmacia hospitalaria.
- El período comprendido fue desde el inicio de su prescripción hasta julio de 2017.

Resultados


VARIABLES DE ESTUDIO

- Características de los pacientes :**
 - Edad
 - Sexo
- Variables relacionadas con el tratamiento:**
 - Líneas de tratamiento previas
 - Número de ciclos de pomalidomida recibidos
 - Toxicidad
 - Tratamientos posteriores recibidos
- Variables de eficacia :**
 - Supervivencia libre de progresión (SLP): Período comprendido desde el inicio de tratamiento con pomalidomida hasta la fecha de documentación de progresión o muerte.


Datos de los pacientes

Total pacientes incluidos	25
Mujeres	13 (52%)
Edad (mediana)	65.5 años (rango 49-81)

Respuesta al tratamiento



Efectos secundarios



Datos del tratamiento

Líneas de tratamiento previas (mediana)	4 (rango 2-6)
Pacientes finalizados	20
Ciclos recibidos (mediana)	2.5 (rango 1-19)
Discontinuaciones	
<i>Por toxicidad</i>	4
<i>Por progresión</i>	16
Tratamientos posteriores (n=16)	
<i>Ciclofosfamida</i>	5
<i>Carfilzomib</i>	3
<i>Filanesib (ensayo clínico)</i>	3
<i>Otros</i>	5

Datos de eficacia

Total pacientes incluidos	19
SLP (meses)	3 (rango 1-19)

Conclusiones

- ✓ Los pacientes que recibieron pomalidomida en nuestro centro son pacientes muy pretratados, ajustándose la prescripción a las indicaciones de ficha técnica
- ✓ La mediana de ciclos recibidos ha sido de 2.5, siendo las respuestas al tratamiento variables.
- ✓ La mayoría de pacientes tratados presentaron efectos adversos, principalmente citopenias
- ✓ Se necesitaría un mayor número de pacientes para confirmar estos resultados

