



# DESPRESCRIPCIÓN DE MEDICACIÓN CRÓNICA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS AVANZADOS

## Objetivos

- Analizar la medicación crónica susceptible de ser desprescrita en pacientes con enfermedad oncológica metastásica en tratamiento antineoplásico intravenoso y/u oral.

## Material y métodos


Estudio transversal descriptivo en pacientes oncológicos en estadio IV en tratamiento antineoplásico del 1 de enero al 31 de mayo de 2017

Módulos de Gestión de Pacientes Ambulantes y Pacientes Externos (Farmatools®) → Selección de pacientes

Visor de Atención Primaria (HORUS®) → Medicación crónica


Historia clínica electrónica (Selene®) → Situación clínica y confirmación de medicación

## Resultados



Distribución de pacientes según el número de fármacos crónicos	n	%
Pacientes que no tomaba ningún fármaco	13	9,8
Pacientes que tomaban < 5 fármacos	36	27,1
Pacientes que tomaban 5-9 fármacos	51	38,3
Pacientes que tomaban 10-14 fármacos	31	23,3
Pacientes que tomaban ≥ 15 fármacos	2	1,5
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>

Distribución de pacientes según el tratamiento antineoplásico	n	%
Pacientes en tratamiento con 1 antineoplásico	61	45,9%
Pacientes en tratamiento con 2 antineoplásicos	48	36,1%
Pacientes en tratamiento con 3 antineoplásicos	12	9,0%
Pacientes en tratamiento con 4 antineoplásicos	11	8,3%
Pacientes en tratamiento con 5 antineoplásicos	1	0,8%
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>



Grupo ATC Medicación desprescrita	%
A. Sistema digestivo y metabolismo	48,4%
B. Sangre y órganos hematopoyéticos	16,0%
C. Sistema cardiovascular	34,4%
M. sistema musculoesquelético	1,2%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>

Distribución de los tratamientos oncológicos por vía de administración	n	%
Intravenoso	80	60,2%
Intravenoso+oral	16	12,0%
Oral	37	27,8%
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>

## Conclusiones

- La introducción del proceso de desprescripción reduce el número de fármacos crónicos adaptando la farmacoterapia a los objetivos terapéuticos de los pacientes.